

Keresse kollégáinkat bizalommal!
www.kwizda.hu/szaktanacsadok • Tel.: +36 1 224 7300

Németh Tibor Fejér megye +36 20 610 7222 tibor.nemeth@kwizda.hu	Sebestyén István Baranya megye + 36 30 982 0766 istvan.sebestyen@kwizda.hu	Varga Balázs Győr-Moson-Sopron megye +36 30 222 2584 balazs.varga@kwizda.hu	Neiner János Szőlőspecialista Tolna, Baranya, Somogy, Zala megye +36 20 967 4116 janos.neiner@kwizda.hu	Péter Ákos Borsod-Abaúj-Zemplén megye +36 30 972 1050 akos.peter@kwizda.hu
Mészáros Béla Heves, Pest, Nógrád megye +36 30 982 0765 bela.meszaros@kwizda.hu	Hámos András Bács-Kiskun megye +36 30 111 6749 andras.hamos@kwizda.hu	Oravecz Péter Heves megye +36 30 978 3722 peter.oravecz@kwizda.hu	Klein Róbert Bács-Kiskun megye déli rész +36 30 797 4574 robert.klein@kwizda.hu	

SZŐLŐ- TECHNOLÓGIA

Megoldások betegségekre, kártevőkre,
gyomokra és a növénytáplálásra



Kötődés



Lombrágya
Wuxal® Boron Plus

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag:
bór és foszfor

A jobb kötődés érdekében a foszfor és bórt nagy mennyiségben tartalmazó **Wuxal® Boron Plus** lombrágyát alkalmazzuk.

A korszerű formulációjának köszönhetően a permetlé kémhatását gyengén savanyú tartományban tartja, így nem csökkenti a kombinációs fungicid hatékonyságát.

Stresszhelyzetek



Lombrágya

Wuxal® Ascofol

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag:
tengeri alga és bór

A kritikus időszakban a zöldtömeg növelése, a sejtmegnyúlás elősegítése, a stressztűrési fokozása és az érés gyorsítása lehetnek azok a kulcskérdések, amik profi megoldást kívánnak!

A **Wuxal® Ascofol** a legnagyobb hatóanyagtartalmú biostimulátor, amely plusz mikro- és makroelemekkel, valamint prémium minőséggel segíti munkánkat.

Napégés, bogyórepedés



Biostimulátor

BIO


Prosilicon®

Dózis: 1,5–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag:
kálium, szilikát

Bőrszövet-erősítő, bogyórepedést megelőző lombrágya és biostimulátor. Napégés vagy egy nagyobb esőzés hatására a bogyók károsodhatnak, ami a bor minőségében fog visszaköszönni. A **Prosilicon®** káliumszilikát-alapú, terménynövelő anyag. Az érési időszakban, a bőrszövet erősítésével ad védelmet a termés repedése ellen. A **Prosilicon®** lúgos kémhatásának köszönhetően, fokozza a szőlő gombabetegségekkel szembeni ellenálló képességét is.

Hosszú tartamhatás



A Corprima 20 SC hatáskifejtés helye, a jelenleg használatos inszekticidek célpontjai

Rovarölő

Corprima 20 SC

Dózis: 0,15–0,175 l/ha

Hatóanyag:
200 g/l klórántraniliprol

A **Corprima 20 SC** hatékony és a hasznos szervezeteket kímélő, szelektív megoldás a szőlőmolyok (tarka- és nyerges szőlőmoly) ellen.

Nappal és virágzás alatt is kipermetezhető, mert a méheknek nem veszélyes. Kontakt, felszívódó és gyomorméreg, mely a tojás- és minden lárvastádium ellen hatásos.

Szexferomon csapdás előrejelzésre alapozva, a rajzáscsúcsot követő 4–6. napon kell kijuttatni. Szőlőben egyszer használható, már az első nemzedék ellen javasolt bevetni.

Lobesia csomag

Corprima 20 SC

Copper-Field®

CSOMAGKEDVEZMÉNY



A **Corprima 20 SC**-t kifejezetten a szőlőtermesztőknek ajánljuk. Ennek jegyében született meg a kb. 6 ha kezelésére elegendő **Lobesia csomag**, melyben a közkedvelt **Copper-Field®**-et csomagoltuk a Corprima 20 SC mellé.

Rovar



Rovarölő

BIO

Lepinox® Plus

Dózis: 1 kg/ha

Hatóanyag:
375 g/kg Bacillus thuringiensis var. Kurstaki baktérium

A **Lepinox® Plus** egy szelektív, biológiai rovarölő szer, amely a Lepidoptera rendbe tartozó kártevők fiatal lárvastádiumai (L1-L2) ellen alkalmazható. A készítmény a kártevők táplálkozásakor kerül a szervezetükbe. Hatására a lárvák mozgása lelassul, táplálkozásuk leáll, majd összezsugorodnak. A teljes pusztulás néhány napon belül következik be.

BBCH



08
Rügyfakadás



14-16
4–6 leveles állapot



50-57
Fürtkezdemények
megjelenése,
fürtmegnyúlás



60-69
Virágzás



71
Bogyókötődés



73-75
Bogyónövekedés



77
Fürtzáródás



80-85
Érés, zsendülés

Copper-Field® / Montaflow

Kupfer Fusilan WG

Botrefin

Copper-Field® / Montaflow

Kupfer Fusilan WG

Botrefin

Associate

Dionys® 80 WG

Linkit

Linkit

Lisztharmat

Jó időzítéssel a fertőzés megelőzhető. Az intenzív hajtásnövekedéskor ajánlott felszívódó szerekkel permetezni a hatékony belső védelem céljából. Virágzáshoz közeledve a veszély egyre jobban fokozódik, indokolt a leghatékonyabb hatóanyagpárosok alkalmazása, később pedig fokozottan kell ügyelni arra, hogy a lombzat épen maradjon.



Gombaölő

Associate

Dózis: 0,25 l/ha

Hatóanyag:
80 g/l tetrakonazol
+ 160 g/l proquinazid

Két hatóanyagot tartalmazó gyári kombináció, mely preventív, kuratív és eradikatív hatással rendelkezik. A tetrakonazol gyorsan felszívódik és szállítódik a növényben, a friss növekménybe is eljut. A proquinazid hatóanyag jól gázosodik, ezért a kezeletlen részekre is eljut. Jelentősen fokozza a növény természetes védekezési mechanizmusát. Hosszú tartamhatás és maximális védelem virágzás idején is.

Botritisz

A szürkepenész az érzékeny szőlővirágzaton egyes virágok, vagy virágrészek fertőződését, leszáradását okozhatja. Érés kezdetén a kis gócból kiinduló fertőzés rövid idő alatt a fürtök szinte teljes pusztulását eredményezi.



Gombaölő

Botrefin

Dózis:
Teljes felület: 0,8–1 kg/ha
Fürtzóna: 0,4–0,5 kg/ha

Hatóanyag:
375 g/kg ciprodinil és
250 g/kg fludioxonil

A mikrogranulátum formátumú szer két hatóanyag gyári kombinációja révén hatékony, megbízható védelmet képes kifejteni a szürkepenészes és monília betegségek ellen, valamint kulcsfontosságú a gombaölő szerekkel szemben kialakuló rezisztencia elkerülésében. A két hatóanyag eltérő hatásmóddal, különböző ponton fejti ki hatását. A **fludioxonil** kontakt módon, a virág, termés felületén képes megakadályozni a gombaspórák kicsírázását és a spóratömlő növekedését. A **ciprodinil** a felületről dinamikusan és folyamatosan jut be a növény epidermiszébe és a mélyebb szöveti részekbe.

Gombaölő

Dionys® 80 WG

Dózis: 1,5-1,8 kg/ha

Hatóanyag:
800 g/kg folpet
Designer hatásfokozóval ajánljuk.

A **Dionys® 80 WG** klasszikus, folpet hatóanyagú készítmény, amely korszerű WG formulációval rendelkezik. Kiválóan működik a peronoszpóra és a botritisz ellen is. Szürkeothadás ellen a virágzás elején, valamint a fürtzáródás előtt a leghatékonyabb. Mindemellett erős rezisztenciatoró tulajdonsággal is rendelkezik.

BBCH



08
Rügyfakadás



14-16
4–6 leveles állapot



50-57
Fürtkezdemények
megjelenése,
fürtmegnyúlás



60-69
Virágzás



71
Bogyókötődés



73-75
Bogyónövekedés



77
Fürtzáródás



80-85
Érés, zsendülés

Corprima 20 SC / Lepinox® Plus

Prosilicon®

Wuxal® Boron Plus

Wuxal® K 40

Wuxal® Ascofol

Feketerothadás

A szőlő feketerothadása az utóbbi években terjedőben lévő betegség, amely egyre gyakrabban jelentkezik Magyarország szőlőültetvényeiben. Minden fiatal zöld növényi rész érzékeny. A fertőzött bogyók töppednek, zsugorodnak, mumifikálódnak. A fürtök érzékenysége a virágsapkák leválásakor kezdődik és zsendülésig tart, de a tünet hamarabb csak a fejlettebb, kb. zöldborsó nagyságú bogyókon jelenik meg.



Gombaölő

Linkit

Dózis: 0,3–0,5 l/ha

Hatóanyag:
400 g/l spiroxamin
és 50 g/l difenokonazol

A **Linkit** spiroxamin és difenokonazol hatóanyagot tartalmazó, kombinált gombaölő szer szőlőben lisztharmat, feketerothadás és pszeudopezikulás orbánc ellen. Felszívódó (szisztemikus) készítmény, melynek két hatóanyaga a kórokozó gombák szterolbioszintézisének gátlásával fejtik ki a hatását, ezáltal belülről védi a szőlőt.

Peronoszpóra



Gombaölő

Copper-Field® / Montaflow

BIO

Dózis: 1,75–2,5 l/ha

Kiemelt hatóanyag:
638 g/l rézoxiklorid
(fémréz tartalom 380 g/l)

A **Copper-Field®/Montaflow** az egyedülálló formulázási módszernek köszönhetően az egyik legkisebb szemcsemérettel és az egyik legjobb fedőképességgel rendelkező folyékony rézoxiklorid-tartalmú gomba- és baktériumölő szer.

Kiemelkedő biológiai aktivitása miatt már 380 g/l fémréznek megfelelő hatóanyag-tartalommal is kiváló hatékonyságot biztosít.

A kezelést előrejelzésre alapozva, a betegség tüneteinek megjelenése előtt kell megkezdni.

Gombaölő

Kupfer Fusilan® WG

Dózis: 2,5–3,0 kg/ha

Hatóanyag:
781 g/kg rézoxiklorid (430 g/kg fémréz) és 43 g/kg cimoxanil

A **Kupfer Fusilan® WG** két hatóanyag, egy cél érdekében: kombinált hatás a peronoszpóra ellen. A cimoxanil gyorsan felszívódó hatását jól egészíti ki a kontakt rézoxiklorid, mindez korszerű, mikrogranulált formulációban. Elsősorban a szőlő virágzás utáni időszakában lehet hatékony eszköz a betegség leküzdésében. A készítmény jól keverhető más gomba- és rovarölő szerekkel, valamint lombtrágyákkal is (pl. Wuxal® Ascofol, Wuxal® K-40). A kezelést előrejelzésre alapozva, a betegség tüneteinek megjelenése előtt kell megkezdni.